

PAUTA PACIENTS ANTICOAGULATS AMB SINTROM (Acenocumarol) QUE NECESITIN PROCEDIMENT QUIRURGIC MENOR (Fotocoagulació amb làser, infiltracions, cateterisme cardíac, exploracions endoscòpiques amb probable presa de biòpsies, catarates amb anestèsia retrobulbar) **I QUE TINGUIN ALT RISC TROMBÒTIC** (Pròtesis valvulars cardíacaes, tromboembolisme venós en els 3 mesos previs i altres diagnòstics amb embolisme sistèmic previ)

Dia -3 Pre intervenció: No Sintrom

Dia -2 Pre intervenció: No Sintrom +
Clexane 40 mg, 1 injecció subcutània a les 19 hores

Dia -1 Pre intervenció: No Sintrom +
Clexane 40 mg, 1 injecció subcutània a les 19 hores

Dia 0 Intervenció: Reiniciar Sintrom en la seva pauta habitual +
Clexane 40 mg, 1 injecció subcutània a les 19 hores

Dia +1 Post intervenció: Sintrom en la seva pauta habitual +
Clexane 40 mg, 1 injecció subcutània a les 19 hores

Dia +2 Post intervenció: Sintrom en la seva pauta habitual +
Clexane 40 mg, 1 injecció subcutània a les 19 hores

Dia +3 Post intervenció: Stop Clexane i continuar només amb Sintrom en la seva pauta habitual

Anar a control de Sintrom en el seu centre de referència el _____
(s'aconsella fer el control el 8 /10 dies)

**SERVEI HEMATOLOGIA
ALTHAIA
XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA**